

INDRETNING AF UDEAREALER – HVOR ER KYLLINGERNE?

Anne Louise Frydendahl Hellwing og Sanna Stenfeldt,
Aarhus Universitet – AU Foulum







FORSØG PÅ GOTHENBURG




FLERE KYLLINGER UDE, NÅR DER ER ADGANG TIL BEVOKSNING



BETYDNING AF VEJRET




KYLLINGERNE FORETRÆKKER BEVOKSNING FREM FOR MARK



LYS SKYGGE FORHOLD I BEVOKSNING



Andel af kyllinger i bevoksning,
% af kyllinger ude



FORSØG FOULUM



RACE OG FODER PÅVIRKER ANTALLET AF KYLLINGER DER UDE




Foder

K = Kontrolfoder


F = Forsøgsfoder

Råprotein: 193 g/kg
Metionin: 3,1 g/kg
Cystin: 3,8 g/kg

Råprotein: 159 g/kg
Metionin: 2,5 g/kg
Cystin: 3,3 g/kg




ÆLDRE KYLLINGER ER MERE UDE END YNGRE KYLLINGER



ÆLDRE KYLLINGER UDNYTTER EN STØRRE DEL AF AREALET



Pil 3 Pil 2 Pil 1 Græs Pil 1 Pil 2 Pil 3



OPSUMMERING

Hvad kan påvirke kyllingers lyst gå ud

- Mangle på beskyttelse
- Mangle på skygge
- Vejret
- Genotype
- Foder/mulighed for fødesøgning
- Dyrenes alder

Tak for opmærksomheden

